¿Qué se investiga de cada producto?

Guía de las 25 opciones del catálogo, agrupadas por producto. Los hallazgos describen materiales, vías y poblaciones estudiados; no son beneficios comprobados de nuestros viales de investigación.

RETA 15 mg / 20 mg	Investigación del control del peso. Actúa sobre receptores GLP-1, GIP y glucagón. Un ensayo de fase 2 en obesidad encontró una reducción importante de peso. Retatrutida sigue en investigación; este vial no es un medicamento aprobado para adelgazar. Ensayo en humanos - en investigación | Fuente
Tirzepatide 10 / 20 / 30 / 60 mg	Investigación del peso y el metabolismo mediante receptores GIP y GLP-1. Ensayos con formulaciones específicas demostraron reducción sostenida del peso en adultos seleccionados. Sus resultados no establecen la equivalencia de estos viales de investigación. Datos clínicos - formulaciones específicas | Fuente
Semaglutide 10 mg	Investigación del apetito y el peso mediante señalización GLP-1. Ensayos con formulaciones específicas demostraron reducción del peso junto con cambios del estilo de vida. No se ha establecido que este vial equivalga a un medicamento aprobado. Datos clínicos - formulaciones específicas | Fuente
Tesamorelin 10 mg	Investigación de la grasa visceral: grasa alrededor de los órganos, especialmente en lipodistrofia asociada al VIH. Ensayos encontraron reducción de grasa visceral abdominal en esa población. No demuestra pérdida general de peso con este vial. Datos clínicos - población específica | Fuente
Tesamorelin + Ipamorelin 10 mg + 5 mg	Investigación de la señalización de la hormona del crecimiento por distintas vías. No se verificó un beneficio clínico ni una ventaja adicional de esta combinación exacta. Los resultados de tesamorelina sola no validan la mezcla. Beneficios clínicos de la mezcla no verificados | Fuente
GHK-Cu 50 mg	Investigación de reparación cutánea, colágeno y remodelación de tejidos. Existen estudios de laboratorio y pequeños estudios tópicos. No establecen que inyectar este vial mejore la piel, sane lesiones o produzca rejuvenecimiento sistémico. Evidencia principalmente tópica / de laboratorio | Fuente
AHK-Cu 50 mg	Investigación de folículos pilosos y biología del cuero cabelludo. Un estudio encontró efectos en folículos humanos aislados y células cultivadas fuera del cuerpo. No demuestra crecimiento del cabello en personas. Es diferente de GHK-Cu. Evidencia de laboratorio | Fuente
SNAP-8 10 mg	Investigación cosmética de líneas de expresión y arrugas. Se ha incluido en productos tópicos con varios ingredientes; esos estudios no permiten aislar su aporte. No se verificó un beneficio inyectable ni un efecto equivalente al Botox. Investigación de formulaciones tópicas | Fuente
GLOW 70 mg de mezcla total	Mezcla para investigar la piel y la reparación de tejidos. No se verificó un ensayo clínico que establezca beneficios de esta mezcla exacta. Confirme sus componentes con el proveedor; resultados de ingredientes separados no validan la mezcla. Beneficios clínicos de la mezcla no verificados | Fuente
KLOW 80 mg de mezcla total	Investigada en el contexto de piel, reparación de tejidos y vías inflamatorias a través de sus ingredientes. No se verificó un beneficio clínico de esta mezcla exacta. Se necesitan cantidades de ingredientes confirmadas por el proveedor. Beneficios clínicos de la mezcla no verificados | Fuente

¿Qué se investiga de cada producto?

Guía de las 25 opciones del catálogo, agrupadas por producto. Los hallazgos describen materiales, vías y poblaciones estudiados; no son beneficios comprobados de nuestros viales de investigación.

SS-31 10 mg	Investigación de la función mitocondrial. Elamipretida tiene una formulación de prescripción con aprobación acelerada para mejorar la fuerza muscular en personas elegibles con síndrome de Barth. No demuestra beneficios antienvejecimiento o de energía con este vial. Existe una formulación específica aprobada | Fuente
MOTS-C 10 mg	Investigación del metabolismo celular, respuesta al ejercicio y función muscular. Experimentos en animales y observaciones de MOTS-c natural en humanos no establecen beneficios de resistencia, pérdida de grasa o longevidad mediante inyecciones de este producto. Evidencia animal / observacional humana | Fuente
PT-141 10 mg	Investigación del deseo sexual. Ensayos de bremelanotida mejoraron el deseo y el malestar relacionado en mujeres premenopáusicas con trastorno del deseo sexual hipoactivo. No demuestra un beneficio general de rendimiento sexual ni valida este vial en polvo. Datos clínicos - población específica | Fuente
NAD+ 500 mg	Investigación de reacciones celulares de oxidación-reducción y metabolismo energético. Pequeños estudios intravenosos evaluaron metabolismo y tolerabilidad. No se establecieron beneficios antienvejecimiento, de energía o de uso subcutáneo de este vial. Es una coenzima, no un péptido. Evidencia humana limitada | Fuente
KPV 5 mg	Investigación de señalización inflamatoria e inflamación intestinal. Los hallazgos en células y modelos de colitis en ratones son preliminares; no establecen tratamiento de trastornos intestinales humanos, enfermedades cutáneas o inflamación sistémica. Evidencia celular / animal | Fuente
SEMAX 10 mg	Investigación neurológica y de señalización neurotrófica, incluidos estudios de rehabilitación tras un accidente cerebrovascular. Gran parte de la investigación humana usa formulaciones intranasales. No se estableció una mejora de concentración, memoria o recuperación neurológica con este vial. Evidencia humana limitada y específica de la vía | Fuente
Glutathione 600 mg	Investigación antioxidante y de reacciones celulares de oxidación-reducción. Un estudio intravenoso de una mezcla para el tono cutáneo no estableció un beneficio duradero convincente y notificó eventos adversos graves. No se verificaron beneficios de aclaramiento, desintoxicación o bienestar con este vial. Evidencia clínica limitada | Fuente
B-12 vial de 10 mL	La vitamina B-12 se usa médicamente para deficiencia documentada y anemia relacionada. No establece beneficios de energía o pérdida de peso sin deficiencia. La forma y concentración de B-12 de este frasco aún requieren confirmación del proveedor. Tratamiento de deficiencia establecido; producto no verificado | Fuente
BAC Water 3 / 10 / 30 mL	Diluyente de investigación; no es un péptido ni un tratamiento. La compatibilidad depende del material y procedimiento validado. Una etiqueta de investigación no demuestra aptitud como diluyente inyectable estéril. No debe administrarse por sí solo. Diluyente / accesorio de laboratorio | Fuente

SOLO PARA FINES DE INVESTIGACIÓN. NO APTO PARA CONSUMO HUMANO.

Resumen educativo. Sin instrucciones de dosis o tratamiento. Desconocer los riesgos no demuestra seguridad.

Fuentes con enlaces. Revisado el 25 de octubre de 2026. | pureaminopeptides.net